Что нужно знать о гемофильной инфекции

19.09.2025

Гемофильная инфекция типа b вызывается бактерией. Обычно бактерии находятся в носоглотке человека и не вызывают заболевание. Но, при определенных условиях, если бактерии попадают в легкие или в кровь, человек может заболеть. Болезнь распространяется при кашле и чихании от заболевшего.

Симптомы заболевания зависят от того, какая часть тела поражена. Температура характерна для всех форм заболевания:

- менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга),
- эпиглоттит (отек надгортанника на задней стенке глотки),
- пневмония (воспаление легких),
- остеомиелит (воспаление костей и суставов),
- целлюлит (воспаление подкожной клетчатки, обычно на лице).

Заболевание может развиваться быстро, а менингит и эпиглоттит могут привести к летальному исходу.

Риск заболевания гемофильной инфекцией выше у

- Детей в возрасте до 5 лет, находящихся в закрытых коллективах (домах ребенка).
- Детей в возрасте 6-12 месяцев, находящихся на искусственном вскармливании.
- Детей, посещающих или готовящихся посещать детские дошкольные учреждения.

Как эффективно предупредить Хиб-инфекцию?

Единственно эффективным способом предупредить у ребенка развитие Хиб-инфекции является введение вакцины.

Какие вакцины используются для профилактики Хиб-инфекции в современной медицинской практике?

Для предупреждения Хиб-инфекции используются высокоэффективные вакцины, созданные с использованием современных технологий (комбинированные или моновакцина).

Введение таких вакцин хорошо переносится. Вакцины против Хиб-инфекции не содержат живых возбудителей, поэтому заболеть инфекцией в результате введения вакцины невозможно. Прививаются дети с 2-х месяцев в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Дети, ранее не получившие профилактические прививки против гемофильной инфекции прививаются до 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению к данной вакцине.

Используйте все возможности сохранить здоровье малыша!

Здоровый малыш – счастливая семья!

Материал подготовлен помощником врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Дятловский райЦГЭ» Татьяной Казимировной Косило