## Профилактика инфекций, передающихся половым путем



Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) — группа инфекционных заболеваний, которые в основном передаются при половом контакте от больного человека здоровому.

**К ИППП относят** сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную

инфекцию, трихомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов. Кроме того, при половых контактах передаются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, а также некоторые другие заболевания (чесотка, лобковые вши, контагиозный моллюск). На сегодняшний день известно около 30 заболеваний, которые могут передаваться половым путем.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет инфицируются ИППП, а каждый шестой житель страдает каким-либо заболеванием, передаваемым половым путем. В мире от 20 до 50% случаев ИППП встречаются у лиц репродуктивного возраста.

**Основным источником заражения ИППП** является <u>больной человек</u>. **Путь передачи** преимущественно <u>половой</u>. Следует помнить, что заразиться ИППП нельзя при рукопожатиях, объятиях, дружеском поцелуе, использовании телефона, через пищевые продукты, поручни в общественном транспорте, воду в бассейне или водоеме, при укусах насекомых. Однако следует помнить, что ряд заболеваний, например, сифилис, чесотка, контагиозный моллюск могут передаваться в результате <u>тесного бытового</u> контакта.

опровергнуть ИППП Подтвердить или онжом только на основе Самопроизвольное лабораторных тестов. выздоровление при таких заболеваниях, как гонорея, сифилис или трихомониаз невозможно, а при повторном заражении полностью излечившийся человек заболевает снова. Некоторые заболевания, вызванные ИППП, неизлечимы, в том числе ВПЧ, ВИЧ, генитальный герпес.

**Первичная профилактика ИППП** заключается в организации программ, направленных на формирование ответственного сексуального поведения населения для предотвращения инфицирования ИППП.

**Вторичная профилактика** направлена на снижение вероятности передачи инфекции половым партнерам и повторного заражения и включает организацию медицинской помощи пациентам с ИППП.

Помощник врача-гигиениста

У.Ю.Сорочинская