

ВРЕМЯ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

26.09.2025

На сегодняшний день вакцинация является одним из наиболее эффективных и безопасных средств защиты и профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, поскольку она уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания и снижает скорость передачи вируса среди населения.

Учитывая сохраняющуюся регистрацию заболеваемости населения COVID-19 и циркуляцию вирусов SARS-CoV-2, которые являются причиной вирусных пневмоний, целесообразно проводить ежегодную вакцинацию.

Для иммунизации взрослого населения против коронавирусной инфекции в текущем году используется вакцина «Конвасэл». Она произведена в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Данная вакцина эффективна в отношении всех циркулирующих вирусов SARS-CoV-2, как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Согласно информации производителя, эффективность вакцины составляет 83,3%, она обладает благоприятным профилем безопасности.

Продолжительность поствакцинального иммунитета составляет до 12 месяцев.

Министерство здравоохранения в первую очередь рекомендует вакцинироваться против коронавирусной инфекции:

- лицам с иммуносупрессией (в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкозаболеваниями и др.),
- лицам в возрасте старше 60 лет,
- лицам, находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Также на бесплатной основе вакцинироваться от COVID-19 могут все граждане нашей страны, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации. Для вакцинации необходимо обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства.

Медицинские противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят после выздоровления), возраст младше 18 лет.

В поствакцинальном периоде могут развиваться местные реакции (покраснение и боль в месте инъекции), реже – общие реакции (общее недомогание, головная боль, мышечные боли, незначительное повышение температуры тела). Указанные симптомы носят временный характер.

Материал подготовлен помощником врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Дятловский райЦГЭ» Татьяной Казимировной Косило