

ОСТОРОЖНО! ЛЕПТОСПИРОЗ.



Лептоспироз - острое инфекционное заболевание, относящееся к группе природно-очаговых инфекций, возбудителями которого являются различные виды патогенных лептоспир.

Заболевание характеризуется внезапным началом, высокой температурой тела до 39 – 40°C. Больные жалуются на боли в мышцах, суставах. Поражаются печень, почки.

Источником лептоспироза в природе являются многочисленные виды грызунов, особую опасность представляют крысы. Из домашних животных лептоспирозом часто болеют собаки. У сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи) часто отмечается бессимптомное носительство.

Заражение людей происходит при употреблении инфицированных пищевых продуктов, воды. Возможно проникновение лептоспир через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки, в летний период - во время купания. Категорически запрещается купание в водоемах, используемых для водопоя животных или находящихся вблизи мест выпаса животных.

Профилактика. При посещении водоёмов необходимо закрывать порезы или ссадины водонепроницаемой повязкой. При купании избегать попадания воды в рот.

Надевать водонепроницаемую обувь во время рыбной ловли и работы.

После пребывания в пресной природной воде необходимо принять душ;

Использовать воду для питья и мытья овощей и фруктов только после кипячения; не употреблять воду из открытых водоемов.

Продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в плотно закрывающейся таре. Повреждённые грызунами пищевые продукты нельзя использовать в пищу без термической обработки; хранить продукты во время выезда «на природу» в закрытой посуде.

При работе с животными следует надевать перчатки и защитную маску, после контакта с любыми животными необходимо мыть руки, а в конце рабочего дня принимать душ и убирать рабочее место.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мёртвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.

Во время работы при большом количестве пыли (снос старых строений, погрузка сена, соломы, травы, разборка штабелей досок, брёвен, куч хвороста, уборка помещений и т. п.) необходимо использовать рукавицы и респиратор или ватно-марлевую повязку;

Проводить благоустройство территорий дачных участков и частных домов (освобождение от зарослей бурьяна, строительного и бытового мусора), помещения для хранения пищевых продуктов необходимо защищать от проникновения грызунов.



Материал подготовлен помощником врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Дятловский рай ЦГЭ» Богдевич Анной Петровной